

791.45

990.08



- C81 M100 N7
- C20 N65



La plus grande lettre est le «F» de Fervex

F 11,75 mm

IL FAUT FAIRE VITE, IL FAUT *FERVEX*® !

Helvetica Neue 47
condensed
corps 9 pt

M ↑ 2,35 mm

Médicaments contre les symptômes des rhumes, rhinites, rhinopharyngites et des états grippaux de l'adulte. Médicaments contenant du paracétamol, un antihistaminique à effet sédatif et de la vitamine C. Ne pas associer avec d'autres médicaments qui en contiennent, pour éviter tout risque de surdosage. Un surdosage en paracétamol peut endommager le foie de manière irréversible. Pas avant 15 ans. Lire attentivement la notice. Demandez conseil à votre pharmacien. Si les symptômes persistent plus de 5 jours, consultez votre médecin. VISA 16/05/69329731/GP/002



Médicaments contre les symptômes des rhumes, rhinites, rhinopharyngites et des états grippaux de l'adulte. Médicaments contenant du paracétamol, un antihistaminique à effet sédatif et de la vitamine C. Ne pas associer avec d'autres médicaments qui en contiennent, pour éviter tout risque de surdosage. Un surdosage en paracétamol peut endommager le foie de manière irréversible. Pas avant 15 ans. Lire attentivement la notice. Demandez conseil à votre pharmacien. Si les symptômes persistent plus de 5 jours, consultez votre médecin. VISA 16/05/69329731/GP/002

Médicaments contre les symptômes des rhumes, rhinites, rhinopharyngites et des états grippaux de l'adulte. Médicaments contenant du paracétamol, un antihistaminique à effet sédatif et de la vitamine C. Ne pas associer avec d'autres médicaments qui en contiennent, pour éviter tout risque de surdosage. Un surdosage en paracétamol peut endommager le foie de manière irréversible. Pas avant 15 ans. Lire attentivement la notice. Demandez conseil à votre pharmacien. Si les symptômes persistent plus de 5 jours, consultez votre médecin. VISA 16/05/69329731/GP/002

Médicaments contre les symptômes des rhumes, rhinites, rhinopharyngites et des états grippaux de l'adulte. Médicaments contenant du paracétamol, un antihistaminique à effet sédatif et de la vitamine C. Ne pas associer avec d'autres médicaments qui en contiennent, pour éviter tout risque de surdosage. Un surdosage en paracétamol peut endommager le foie de manière irréversible. Pas avant 15 ans. Lire attentivement la notice. Demandez conseil à votre pharmacien. Si les symptômes persistent plus de 5 jours, consultez votre médecin. VISA 16/05/69329731/GP/002





UPSA • Rack Fervex classique/sans sucre/arôme framboise • 10/05/16 • V18

célidÉE