

Состояние Зерна пшеницы должны быть в здоровом, негреющемся состоянии

Цвет Свойственный здоровому зерну данного типа и подтипа. Допускаются первая и вторая степень обесцвеченности

Запах Свойственный здоровому зерну пшеницы, без плесневого, солодового, затхлого и других посторонних запахов

Количество клейковины Не менее 25 %

Качество клейковины, группы, ед. ИДК От 65 - До 85 Ед.ИДК

Число падения Не менее 250 с

Стекловидность 40-48 %

Натура Не менее 730 г/л

Влажность Не более 14,0 %

Содержание сорной примеси Не более 2,0 %

Наличие

испорченных зерен Не более 1,0 %

Куколь Не более 0,5 %

Наличие

трудноотделимой примеси (овсюг, татарская гречиха) Не более 1,0 %

Фузариозные зерна Не более 1,0 %

Зерновая примесь Не более 5,0 %

Наличие

проросшего зерна Не более 1,0 %

Поврежденные зерна (с измененным цветом оболочек и с эндоспермом от кремового до светло-коричневого цвета) Не более 0,5 %

Наличие ячменя Не более 3,0 %

Наличие

зеленых зерен Не более 1,0 %

Наличие зерна, поврежденного клопом-черепашкой Не более 1,0 %

Наличие

зерен пшеницы, имеющие бурую, темно-коричневую или черную окраску оболочек зародышевого конца Не более 10 %

Наличие вредной примеси Не допускается

Наличие мелкой фракции, проход сита 2,2х20 Не более 15 %

Зараженность вредителями и загрязненность мертвыми насекомыми-вредителями Не допускается