



Рекомендации по применению кормовой добавки ИнтаСтаб для производства кормов для продуктивных и непродуктивных животных

ИнтаСтаб – ингибитор патогенной микрофлоры

Общие сведения

ИнтаСтаб – ингибитор роста плесеней, грибов, дрожжей, бактерий в кормах и кормовых ингредиентах.

В качестве действующих веществ содержит бактериостатики и консерванты. Содержание вредных примесей не превышает ПДК для Российской Федерации.

Внешний вид: белый порошок.

Фасовка: полиэтиленовые мешки или бумажные мешки с полиэтиленовым вкладышем от 5 до 25 кг.

Маркировка: этикетка с указанием производителя, его адреса, названия, назначения и способа применения, состава, массы нетто, даты изготовления, срока и условий хранения, номера партии.

Хранение: в упаковке производителя в прохладном, сухом защищенном от света месте при температуре от -15 до +30 °С. Срок хранения - 12 месяцев с даты изготовления.

Биологические свойства

Свойства добавки обусловлены её способностью консервировать корма и кормовое сырьё от процессов гниения, брожения, появления плесени. Бактериостатики блокируют размножение грибковой плесени и бактерий. Консерванты проникают в клетку и подавляют ее метаболизм, в результате чего патогенная микрофлора погибает.

Спектр действия - плесневые и дрожжевые грибы, анаэробные бактерии.





Способ применения

ИнтаСтаб применяют как ингибитор роста патогенной микрофлоры в кормах и кормовом сырье, особенно для продуктов повышенной влажности.

Вводят с помощью технологии ступенчатого смешивания.

Рекомендуемые дозировки

Дозировка ингибитора "ИнтаСтаб" для кормов или их ингредиентов:

- влажность продукта до 10% - 1 кг/т
- влажность продукта 12%-15% - 1,2-1,3 кг/т
- влажность продукта свыше 15% - 1,5-1,8 кг/т

При приготовлении кормов может применяться экструдирование, экспандирование и длительная сушка.

При применении ИнтаСтаба в соответствии с рекомендациями побочных явлений и осложнений не отмечено. Противопоказаний для применения не выявлено.

ИнтаСтаб совместим со всеми ингредиентами кормов, лекарственными средствами и другими кормовыми добавками.

Продукты животноводства, птицеводства и аквакультуры после применения ИнтаСтаба можно использовать в пищевых целях без ограничений.

Преимущество ингибитора "ИнтаСтаб": при повышенной влажности продукта не требуется увеличивать дозировку в несколько раз.

Рекомендация: для эффективного действия ингибитора применять двухступенчатое смешивание. Например, для дозировки 0,1% (1 кг ингибитора на 1 т продукта) сначала тщательно перемешать ингибитор с продуктом в соотношении 1:49, т.е. 2 кг ингибитора на 98 кг продукта. Затем полученный концентрат добавлять в конечный продукт в соотношении 1:19, т.е. 5 кг концентрата на 95 кг продукта.





Примечание: Поскольку влажность продукта в процессе ненадлежащего хранения может повышаться на 3-4%, то для страховки рекомендуется добавлять ингибитор из расчета на 0,2-0,3 кг/т больше. Например, для исходной влажности продукта до 10% добавлять ингибитор не 1 кг/т, а 1,2-1,3 кг/т.

Правила безопасности

При работе с ИнтаСтабом следует соблюдать правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с кормовыми добавками, использовать средства индивидуальной защиты: спецодежду, перчатки, респираторы. ИнтаСтаб следует хранить в местах, не доступных для детей.

Рекомендации разработаны: ООО «ПК «ИнтАл».

